

提出日 202 年 月 日

沖縄カトリック中学高等学校
学 校 長 殿

インフルエンザ・新型コロナウイルス対策による出席停止に関する経過報告書

下表の通り、「学校保健安全法第 19 条」ならびに「非常変災等児童生徒又は保護者の責任に帰すことのできない事由での欠席」に基づき、登校を控え家庭にて経過観察を行いました。登校基準を満たしましたので、出席停止措置の解除をお願いいたします。

	測定月日	測定時間（朝）：体温 症状	測定時間（夕）：体温 症状
発症日 （0日目）	月 日	（ 時 分） 咳・鼻水・のど・他（ ）℃	（ 時 分） 咳・鼻水・のど・他（ ）℃
1日目	月 日	（ 時 分） 咳・鼻水・のど・他（ ）℃	（ 時 分） 咳・鼻水・のど・他（ ）℃
2日目	月 日	（ 時 分） 咳・鼻水・のど・他（ ）℃	（ 時 分） 咳・鼻水・のど・他（ ）℃
3日目	月 日	（ 時 分） 咳・鼻水・のど・他（ ）℃	（ 時 分） 咳・鼻水・のど・他（ ）℃
4日目	月 日	（ 時 分） 咳・鼻水・のど・他（ ）℃	（ 時 分） 咳・鼻水・のど・他（ ）℃
5日目	月 日	（ 時 分） 咳・鼻水・のど・他（ ）℃	（ 時 分） 咳・鼻水・のど・他（ ）℃
↑ インフルエンザ・新型コロナウイルス陽性になった場合には、必ず休まないといけない期間です↑			
6日目	月 日	（ 時 分） 咳・鼻水・のど・他（ ）℃	（ 時 分） 咳・鼻水・のど・他（ ）℃
7日目	月 日	（ 時 分） 咳・鼻水・のど・他（ ）℃	（ 時 分） 咳・鼻水・のど・他（ ）℃
8日目	月 日	（ 時 分） 咳・鼻水・のど・他（ ）℃	（ 時 分） 咳・鼻水・のど・他（ ）℃
9日目	月 日	（ 時 分） 咳・鼻水・のど・他（ ）℃	（ 時 分） 咳・鼻水・のど・他（ ）℃
10日目	月 日	（ 時 分） 咳・鼻水・のど・他（ ）℃	（ 時 分） 咳・鼻水・のど・他（ ）℃

医療機関名		受診日（検査日）	202 年 月 日
診断結果		結果通知日	202 年 月 日
抗原検査キット メーカー名	☐ 鼻腔検体用 ☐ 唾液検体用	購入場所	☐ 調剤薬局 ☐ RADECO（ラデコ） ☐ その他（ ）
検査結果		検査日	202 年 月 日

検査に使用できる抗原キットは、国の薬事承認を受けた「医療用」「体外診断用」に限ります。

生徒氏名：
保護者氏名：

印

発熱（37.5℃以上、あるいは平熱+1℃）があった場合には
医療機関の受診（あるいは登校前の家庭での抗原検査）をお願いします。
登校目安は医師にご確認ください。

「新型コロナウイルス感染症出席停止期間の基準」早見表

発症日 0日目	発症後 1日目	発症後 2日目	発症後 3日目	発症後 4日目	発症後 5日目	発症後 6日目	発症後 7日目	発症後 8日目	発症後 9日目	発症後 10日目
				症状 軽快後 1日目	待機日	登校可（マスク着用） 				
					症状 軽快後 1日目					
						症状 軽快後 1日目	症状 軽快後 1日目			
										
								症状 軽快後 1日目		

- ・発症した後5日を経過し、かつ、症状軽快後1日を経過するまで（発症日、症状軽快日は0日目）
- ・発症後10日目までは人にうつしてしまう可能性が残るためマスク着用をお願いします
- ・症状軽快とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、咳・咽頭痛・鼻水が改善傾向にあることを指します

「インフルエンザ出席停止期間の基準」早見表

発症日 0日目	発症後 1日目	発症後 2日目	発症後 3日目	発症後 4日目	発症後 5日目	発症後 6日目	発症後 7日目	発症後 8日目	発症後 9日目	発症後 10日目
			解熱後 1日目	解熱後 2日目	待機日	登校可 				
				解熱後 1日目	解熱後 2日目					
					解熱後 1日目	解熱後 2日目				
						解熱後 1日目				
							解熱後 1日目	解熱後 2日目		

- ・発症した後5日を経過し、かつ、解熱後2日を経過するまで（発症日、解熱日は0日目）
- ・解熱日とは、解熱剤などの服用がなくとも平熱に戻った日のことです